

UOSD di ODONTOIATRIA

VADEMECUM PER LE EMERGENZE ORTODONTICHE

IN CONSIDERAZIONE DEL PROLUNGARSI DELLA SOSPENSIONE DELLE VISITE AMBULATORIALI E DEI CONTROLLI ORTODONTICI, HO RITENUTO UTILE DIFFONDERE SULLA WEBMAIL SANTOBONO-PAUSILIPON QUALCHE CONSIGLIO PER AFFRONTARE LE **EMERGENZE ORTODONTICHE** CHE, VISTO L'ALLUNGAMENTO DELL'INTERVALLO CHE INTERCORRERA' TRA L'ULTIMA VISITA DI CIASCUN PAZIENTE E LA SUCCESSIVA, SONO INEVITABILI.

INIZIANDO CON LE SITUAZIONI PIU' DELICATE...CHI STA ATTIVANDO IL DIASTASATORE, DEVE EFFETTUARE LE ATTIVAZIONI (I GIRI CON LA CHIAVETTA) FINO A QUANDO PRESCRITTO, CIOE' FINO ALLA DATA DELL'APPUNTAMENTO; POI FERMARSI ASSOLUTAMENTE! L'APPARECCHIO DEVE RIMANERE IN SITU. SE DOVESSE STACCARSI UNO DEGLI ANELLI (BANDE) CHE LO SOSTENGONO, SI CERCHI DI STACCARE ANCHE L'ALTRA, MAGARI FORZANDO UN PO'.

ANCHE IN CASO DI DISTACCO DELLA BARRA PALATALE, CHE AVVIENE SOLITAMENTE DA UN LATO, E' UTILE SFILARLA ANCHE DAL LATO OPPOSTO; SE NON SI RIESCE A SFILARE DAL SUO AGGANCIAMENTO, TIRARE VERSO IL BASSO L'ANELLO (BANDA) ANCORA FISSATO AL MOLARE.

SE A MUOVERSI O STACCARSI SONO GLI UNCINI CHE SOSTENGONO GLI ELASTICI INTERMASCELLARI, BISOGNA PROVARE AD AGGANCIARE L'ELASTICO DIRETTAMENTE AL BRACKET (VOLGARMENTE DETTO "STELLINA"); NON RIUSCENDOCI, L'USO DEGLI ELASTICI VA INTERROTTO DA ENTRAMBI I LATI. COLORO CHE PORTANO ELASTICI INTERMASCELLARI, QUANDO LA TEMPISTICA DEGLI APPUNTAMENTI DI CONTROLLO SI ALLUNGA, E' PREFERIBILE CHE LI METTANO SOLO LA NOTTE.

ALTRA EVENTUALITA' MOLTO FREQUENTE, LEGATA ALLA MASTICAZIONE ED AL LAVAGGIO DEI DENTI, E' LO SCIVOLAMENTO DEL FILO VERSO DESTRA O SINISTRA, NELLA PARTE POSTERIORE DELLA BOCCA; OVVIAMENTE , LO SPOSTAMENTO DEL FILO, CHE RISULTA PUNGENTE, PROVOCA DOLORE E\O PICCOLE FERITE. BISOGNA IN QUESTO CASO , CERCARE DI RIPOSIZIONARE IL FILO, PROVANDO CON UNA PINZETTA, DISINFETTATA, A TRAZIONARLO DAL LATO OPPOSTO A QUELLO DELLO SCIVOLAMENTO. SE NON SI RIESCE A RIPOSIZIONARE, E' OPPORTUNO TIRARE VIA IL FILO OPPURE CON UN TRONCHESINO, DISINFETTATO, TAGLIARLO. E' OPPORTUNO POI FARE SCIAQUI CON COLLUTORIO A BASE DI CLOREXIDINA ALLO 0,12%

IN GENERALE, QUALUNQUE "PEZZO" DELL'APPARECCHIO FISSO DOVESSE STACCARSI, E' OPPORTUNO ESPELLERLO DALLA BOCCA ; QUALORA PERO',NON FOSSE RITROVATO IN BOCCA, NON PREOCCUPATEVI PERCHE' CON MOLTA PROBABILITA' RIMANE INGLOBATO NEL BOLO ALIMENTARE E DIGERITO ED ESPULSO.

CHI PORTA PLACCHE O PRESIDI MOBILI DEVE CONTINUARE A PORTARLI COME PRESCRITTO. IN CASO DI ROTTURA, SI DEVE OVVIAMENTE INTERROMPERE L'USO.

SI RACCOMANDA SEMPRE UN'ACCURATA IGIENE ORALE.

A RIVEDERCI

Il Responsabile della UOSD di Odontoiatria

A.O.R.N. SANTOBONO - PAUSILIPON

S.S.D. DI ODONTOIATRIA
Dott.ssa Carmela Marraudino

Responsabile
Dott.ssa Carmela Marraudino

NA 000175

